


Alerte Sanitaire : La Leptospirose aux Antilles

Comprendre la menace, identifier les failles et briser la chaîne de contamination à la source.

Un briefing de sécurité sanitaire par Eco-Traitement.
Basé sur les données 2025 de Santé publique France.

L'escalade clinique : un bilan 2025 alarmant

En Martinique, le taux d'incidence atteint 19 cas pour 100 000 habitants, marquant une forte hausse par rapport à 2024. Derrière ces statistiques se cachent des évolutions cliniques graves.



La leptospirose ne doit pas être considérée comme une maladie anodine.

Source : Bilan Santé publique France, août 2026

Anatomie de la transmission : Le rat, l'eau et l'homme

La leptospirose est une maladie bactérienne. L'infection humaine survient indirectement, exploitant la moindre faille faille de notre barrière cutanée.




Bloquer une seule de ces étapes suffit pour briser la chaîne de contamination.

Le mythe de la maladie des rivières sauvages

Parmi les 36 cas ayant déclaré une activité à risque en 2025, la majorité des expositions se sont produites dans la sphère domestique ou professionnelle quotidienne, non pas en milieu sauvage.

Ciblage des Activités



~60% (6 sur 10)

Jardinage, agriculture ou élevage
(L'activité la plus à risque)

~25% (1 sur 4)

Randonnée, canyoning ou trail

22 sur 32

C'est la proportion de patients infectés ayant signalé la présence de rongeurs à proximité immédiate de leur domicile.

L'effet multiplicateur des fortes pluies

Aux Antilles, le risque n'est pas statique. Entre juin et novembre, les précipitations transforment l'environnement et accélèrent la propagation bactérienne.

Saison Sèche (Risque localisé)



- Bactéries confinées aux abords immédiats des terriers.
- Rongeurs à distance des habitations.

Saison Humide : Juin - Nov (Risque diffus et infiltré)



- Lessivage des sols : Dispersion des bactéries dans les boues et flaques.
- **Migration** : Montée des eaux poussant les rats à chercher refuge à l'intérieur des habitations et entrepôts.

Santé publique France recommande une vigilance maximale lors du nettoyage (jardin ou cour) après plusieurs jours de pluie.

Cartographie des vulnérabilités domestiques


La présence de rats n'est jamais une coïncidence. C'est le résultat d'un environnement offrant un accès facile à la triade de survie : eau, nourriture, et refuge.

Anatomie d'une Zone à Risque

1. Les Sources Alimentaires :
Fruits tombés au sol, nourriture pour animaux laissée en extérieur, sacs-poubelles mal fermés.

2. Les Zones de Refuge :
Végétation très dense contre les murs, tas de vieux cartons, matériaux ou encombrants stockés au sol.

3. Les Points d'Entrée :
Passages de canalisations non scellés, jours sous les bas de portes, aérations techniques, faux plafonds.



Détecter la menace : Signes environnementaux et cliniques

L'absence de rats visibles le jour ne garantit pas l'absence d'infestation. Savoir identifier les traces indirectes est crucial.

L'Empreinte du Rongeur

- Déjections fraîches
- Bruits dans les cloisons/plafonds
- Emballages et câbles rongés
- Traces de passage (frottements)
- Terriers visibles près des fondations

L'Alerte Médicale

Symptômes initiaux : Syndrome d'apparence grippale (fièvre soudaine).



Le Réflexe Vital : En cas de fièvre apparue après du jardinage, le nettoyage d'une cour boueuse ou une baignade en eau douce, consultez immédiatement un médecin en précisant votre exposition.

Dératisation : Traiter le symptôme vs Éliminer la cause

L'objectif ne doit pas être d'éliminer quelques individus visibles, mais de comprendre la dynamique de l'infestation pour empêcher tout retour.

Matrice de Lutte Anti-Rongeurs

Approche Réactive (Solutions Domestiques)	Stratégie Curative et Préventive (Intervention Professionnelle)
Tuer les individus isolés.	Identifier l'origine, les passages et la source d'attraction.
Limité aux zones où les rats ont été aperçus.	Cartographie globale, traitement des nids, sécurisation des accès (faux plafonds, réseaux).
Temporaire. La colonie se renouvelle.	Durable. Réduction systémique du réservoir bactérien dans l'environnement.

L'équation de prévention globale

Santé publique France le souligne : la dératisation seule ne remplace pas l'hygiène, et l'hygiène seule ne résiste pas à une forte infestation. La protection est un système.



Sécurisez votre environnement avec Eco-Traitement

En Martinique et en Guadeloupe, la prévention contre la leptospirose exige une vigilance permanente.
N'attendez pas qu'une présence occasionnelle se transforme en infestation structurelle.



Diagnostic Expert :
Identification précise des
signes et zones de passage.



Stratégie Adaptée :
Solutions efficaces, durables
et respectueuses de
l'environnement tropical.



Savoir-faire :
Plus de 25 ans d'intervention
auprès des particuliers et
professionnels aux Antilles.

Martinique : +596 596 57 15 51 |
Habitation Roches Carrées, Le Lamentin

Guadeloupe : +590 590 92 24 24 |
Imm. Challenger, Baie-Mahault

www.eco-traitement.fr/contact